

Evaluation of Sholla 45% OD Herbicide against Grasses and Broad - Leaf Weeds on Barley

Department of Plant Pathology, Southern Agricultural Research Institute, Areka Agricultural Research Center, P.O. Box 79, Areka, Ethiopia

The annual average national yield of the barley crop is only 1200 kg/ha. The low national average yield, which is far below the world average, could be partially attributed to poor weed management, which results in high competition from weeds. Yield gains from weed control, on the other hand, ranges from 14-60 percent depending on the location and type

06 52'55"
037 49' 15" (), 06 88' 79" 037 80' 18" ()
() 06 85' 28" 037 76' 10" ().
() 2105.94 (), 2200 ()
() 2156 ()
(), ()
() 1200-
13001 () 11-26
5.2

Tea e , de , fe e , e a d , a a e e

2022
33 461
10 101
1.51 2.0
-1307
45% 0.5 200
() 1 250
() 10
21-25

- íÉÁ Öæ||^ÁÔÖÉÁÓ^!}æiã•Á TŠÉÁ S^||•ÁRRÁÇGEEÍDÁ Ò ^&cá [-Á, ^^áÁ!^ { [çæ|Ácá { í} *Áæ}áá spacing on soil moisture in corn Zea maysÉÁ Y ^^ááV^&@} [ÁGÇGDÁHJÉ I €JÉ
6. Öæçæ•^}æ]æc@^Á ÓÜÁ ÇGEEÍDÁ Ò &á^}&^Á í}áí&^•Á -[íÁ CE*íá&^]c~!æ|Á Tæ}æ*^ { ^}cÁ ResearchÉÁ B^, ÁQ} áæ}ÁU~ àí•@í} *ACE*^} &^Á B^, ÁÓ^|@áQ} áææÁ Í Í É É É
7. ÓJÉÓæ, æàí CE T U É Á S @ [[[~ • Á CE U Á Ç G E E H D Á Ò ^ & c á [- Á • ^^ á í} * Á æ c ^ Á æ } á Á { ^ c @ [á Á [- Á, ^^ á Á & [] c : [[Á [] Á c ^ Á Á U ! [á ~ & c á ç á c ^ Á [- Á Ó í : æ Á G E E É Á æ Á] ; [{ í • í } * Á á æ | ^ Á í } } á Á í new lands conditionÉÁ Ó * ^] c Á R Á [- Á CE * í á & Á Ú • Á í F Ç H D K F É í í Á É F É J I É